


マラリア予防薬について

マラリアは蚊に刺されることで感染する病気です。1週間から4週間の潜伏期間をおいて、発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などの症状が出ます。マラリアには4種類（熱帯熱マラリア、三日熱マラリア、四日熱マラリア、卵形マラリア）あります。発病後早期であれば抗マラリア薬内服で治療可能ですが、熱帯熱マラリアは発症から24時間以内に治療しないと重症化し、しばしば死に至ります。脳症、腎症、肺水腫、重症貧血など、さまざまな合併症がみられます。

【主要流行地】 アフリカ熱帯部。特に西アフリカ、中央アフリカでは都市部でも存在します。
その他、南アジア、パプアニューギニア、中南米などは主に田舎に存在します。

マラリアのリスクのある国(2010年)



厚生労働省検疫所 HP より引用

【使用製剤】 マラロン®配合錠

マラロン®小児用配合錠（体重 11～40kg の小児）

【服用方法】 1日1回 流行地への渡航前日から、流行地を出た後7日間服用します。

成人 1回1錠

小児 11～20kg 1回1錠

21～30kg 1回2錠

31～40kg 1回3錠

【費用】 成人用 500円/錠、小児用 170円/錠（健康保険は適用されません）

【服用できない方】 重度の腎障害のある患者

【副作用】 頭痛、腹痛、嘔吐、下痢、皮膚粘膜眼症候群、肝障害、アナフィラキシー、汎血球減少など

【受取方法】 処方箋を当院前のクオール薬局に提出後、後日の受け取りとなります。

【注意事項】 予防薬を内服していても感染することがありますので、蚊に刺されないよう予防してください。
また感染を疑う症状が出た場合は速やかに医療機関を受診し、マラリア流行地へ渡航したことを申告してください。

<マラリア予防薬を内服する患者様へ>

使用製剤：マラロン®配合錠

マラロン®小児用配合錠（体重 11～40kg の小児）

服用方法：1 日 1 回 流行地への渡航前日から、流行地を出た後 7 日間服用します

費用：成人用 500 円／錠、小児用 170 円／錠 （健康保険は適用されません）

～受け取り手順～

- ① クリニック 2 階で会計後、処方箋を受け取ってください。
- ② 当院前のクオール薬局大同店へ処方箋を提出してください。
※他の院外薬局では受け取りができません
- ③ 処方箋受理後に製造元へ取り寄せとなります。
患者様へのお渡しは、次回来院時の受け取り、または次回来院予定のない場合はご自宅へ郵送させて
頂きます。

だいどうクリニック 予防接種センター

TEL : 052-611-8650 FAX : 052-611-8651

<マラリア予防薬を内服する患者様へ>

使用製剤：マラロン®配合錠

マラロン®小児用配合錠（体重 11～40kg の小児）

服用方法：1 日 1 回 流行地への渡航前日から、流行地を出た後 7 日間服用します

費用：成人用 498.1 円／錠、小児用 161.5 円／錠 （健康保険は適用されません）

～受け取り手順～

- ① クリニック 2 階で会計後、処方箋を受け取ってください。
- ② 当院前のクオール薬局大同店へ処方箋を提出してください。
※他の院外薬局では受け取りができません
- ③ 処方箋受理後に製造元へ取り寄せとなります。
患者様へのお渡しは、次回来院時の受け取り、または次回来院予定のない場合はご自宅へ郵送させて
頂きます。

だいどうクリニック 予防接種センター

TEL : 052-611-8650 FAX : 052-611-8651