

# 輸入 A 型肝炎ワクチン接種説明と同意書

私は、患者 \_\_\_\_\_ 様に対し、実施する下記ワクチンについて、次のように説明しました。

目的：A 型肝炎はアジア、アフリカ、中南米で流行している感染症です。A 型肝炎ウイルスに汚染された水や食物を介して経口感染します。潜伏期は 2～6 週間で、感冒様症状、発熱の後、食欲不振、倦怠感、腹痛、下痢が起こります。命に係わることは稀ですが、療養に 1 ヶ月程度かかります。

周りの人に移してしまう危険もあります。国内で承認されたワクチンもありますが、海外のワクチンとの互換性は確立されていません。接種スケジュール、効果の違いもあります。出発までに時間がなく海外で追加接種が必要な方、免疫を長く保たせたい方には輸入 A 型肝炎ワクチンがお勧めです。

使用ワクチン：AVAXIM® (SANOFI PASTEUR 社製)

接種方法：1 歳以上で接種可、渡航の 2 週間前までに初回接種を行うことが望ましい

2 回（初回 1 回、6～12 ヶ月後(36 か月以内)追加 1 回) 筋肉注射

1 歳～15 歳 AVAXIM PEDIATRIC 1 回 0.5ml

16 歳～成人 AVAXIM 1 回 0.5ml

接種料金：12,000 円（税別）

有効性： 1 回の接種で 2 週間後に 95%、1 ヶ月後にはほぼ 100%抗体陽性となる。

1 回の接種では 3 年ぐらい。半年～3 年以内の追加接種で追加接種後 10 年以上効果が持続。

副反応： 接種部位の発赤、腫脹や痛み、倦怠感、頭痛、乳幼児では不機嫌、傾眠など

ネオマイシンにアレルギーのある方、今までに A 型肝炎のワクチンでアナフィラキシーショックを起こした方には接種できません。

注意事項：輸入ワクチンのため、国内未承認です。副反応が生じた時は国の救済措置、補償が適応されません。輸入商社が提供する輸入ワクチン補償制度を利用できます。輸入ワクチン補償制度以外は当院では補償できません。

\*\*\*\*\*

## 輸入ワクチン副作用被害救済補償制度について

輸入ワクチンによって重篤な副反応が起きた場合、補償金をお支払いする制度です。

制度の利用にあたり、裁判で輸入ワクチン接種による被害であることが認められる必要があります。

\*\*\*\*\*

ご不明な点がございましたら予防接種センターの医師、看護師にお尋ねください。

年 月 日

同意取得医：だいどうクリニック 予防接種センター \_\_\_\_\_

だいどうクリニック院長 様

上記のとおり実施ワクチンの説明を受け、理解しましたので、その実施に同意します。

また同意書の控えを受け取りました。

年 月 日

本人署名： \_\_\_\_\_ (印)

代諾者氏名： \_\_\_\_\_ (印)

(本人との関係： \_\_\_\_\_ )