


# マラリア予防薬について

マラリアは蚊に刺されることで感染する病気です。1週間から4週間の潜伏期間をおいて、発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などの症状が出ます。マラリアには4種類（熱帯熱マラリア、三日熱マラリア、四日熱マラリア、卵形マラリア）あります。発病後早期であれば抗マラリア薬内服で治療可能ですが、熱帯熱マラリアは発症から24時間以内に治療しないと重症化し、しばしば死に至ります。脳症、腎症、肺水腫、重症貧血など、さまざまな合併症がみられます。

**【主要流行地】** アフリカ熱帯部。特に西アフリカ、中央アフリカでは都市部でも存在します。  
その他、南アジア、パプアニューギニア、中南米などは主に田舎に存在します。

## マラリアのリスクのある国(2010年)



厚生労働省検疫所 HP より引用

**【使用製剤】** マラロン®配合錠

マラロン®小児用配合錠（体重11～40kgの小児）

**【服用方法】** 1日1回 流行地への渡航前日から、流行地を出た後7日間服用します。

成人 1回1錠

小児 11～20kg 1回1錠

21～30kg 1回2錠

31～40kg 1回3錠

**【費用】** 成人用500円／錠、小児用170円／錠（健康保険は適用されません）

マラロンの処方のみの方は、処方料として1000円がかかります。

他にワクチン接種がある場合は必要ありません。

**【服用できない方】** 重度の腎障害のある患者

**【副作用】** 頭痛、腹痛、嘔吐、下痢、皮膚粘膜眼症候群、肝障害、アナフィラキシー、汎血球減少など

**【受取方法】** 処方箋を当院前のクオール薬局に提出後、後日の受け取りとなります。

**【注意事項】** 予防薬を内服していても感染することがありますので、蚊に刺されないよう予防してください。  
また感染を疑う症状が出た場合は速やかに医療機関を受診し、マラリア流行地へ渡航したことを申告してください。

## マラリア予防薬を内服する患者様へ

使用製剤：マラロン®配合錠

マラロン®小児用配合錠（体重 11～40kg の小児）

服用方法：1日1回 流行地への渡航前日から、流行地を出た後7日間服用します

費用：成人用 500 円／錠、小児用 170 円／錠（健康保険は適用されません）

マラロンの処方のみの方は、処方料として 1000 円かかります。

他にワクチン接種がある場合は必要ありません。

### ～受け取り手順～

① クリニック 2 階で会計後、処方箋を受け取ってください。

② 当院前のクオール薬局大同店へ処方箋を提出してください。

※他の院外薬局では受け取りができません

③ 処方箋受理後に製造元へ取り寄せとなります。

患者様へのお渡しは、次回来院時の受け取り、または次回来院予定のない場合はご自宅へ郵送させていただきます。

だいどうクリニック 予防接種センター

TEL : 052-611-8650 FAX : 052-611-8651