

お名前:

0歳で受けましょう

ワクチンの種類	チェック欄	推奨年齢	接種可能年齢	
B型肝炎	1回目	生後すぐから	生後すぐ～	
	2回目	1回目から1ヶ月後		
	3回目	2回目から半年後		
ロタ	1回目	6週から	6週～	
	2回目	1回目から4週あけて	ロタリックスは ～24週までに	
	※ロタテック	3回目	2回目から4週あけて ロタテックは ～32週までに	
Hib (インフルエンザ菌b型)	1回目	2ヶ月から	2ヶ月～5歳未満	
	2回目	1回目から3～8週間		
	3回目	2回目から3～8週間		
肺炎球菌	1回目	2ヶ月から	2ヶ月～5歳未満	
	2回目	1回目から4週あけて		
	3回目	2回目から4週あけて		
BCG		5～8ヶ月	1歳未満	
4種混合 DPT-IPV	第1期初回	1回目	3ヶ月から 3～90ヶ月未満	
		2回目		1回目から3～8週間
		3回目		2回目から3～8週間

1歳になったら受けましょう

ワクチンの種類	チェック欄	推奨年齢	接種可能年齢
MR	1期	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満
肺炎球菌	追加	1歳から (3回目から60日以上 あけて)	1歳～ 5歳未満
おたふく※※		1歳から	1歳～
水ぼうそう※※		1歳から	1歳～
Hib	追加	3回目の7～13ヶ月後	1歳～5歳未満
4種混合 DPT-IPV	追加	3回目の1年～1年半後	5歳未満

※※免疫をより確実にするためにおたふくは4～6歳頃、水ぼうそうは1回目の数ヶ月～1年以内に2回目を接種することが推奨されています

入学するまでに受けましょう

日本脳炎	1期初回	1回目	3歳～	6～90ヶ月未満
		2回目	1回目から1～4週間	
	1期追加	追加	2回目から1年後	
MR	2期	年長	年長の1年間	

小学校で受けましょう

日本脳炎	2期	小学4年生	9～13歳未満
DT	2期	小学6年生	11～13歳未満

中学校で受けましょう(女子のみ)

子宮頸がん	1回目	小学6年生～	小学6年生～ 高校1年生
	2回目	1回目の1～2ヶ月後	
	3回目	1回目の6ヶ月後	