

診療科	癌腫	レジメン名	一般名	投与量	投与時間	施行日	1コースの期間
血液内科	急性骨髄性白血病	CAG	シタラビン	20mg/m ²	30分	1~14日目	28日
			アクリルピシチン	14mg/m ² (15~69歳) 10mg/m ² (70歳以上)	24時間	1~4日目	
			G-CSF	200 μg/m ²	ゆっくり	1~14日目	
	急性骨髄性白血病	MEC	ミトキサントロン	8mg/m ²	1時間	1~3日目	28日
			エトポシド	100mg/m ²	1時間	1~5日目	
	急性骨髄性白血病	IDR+Ara-C	シタラビン	100mg/m ²	24時間	1~7日目	
			イダルビシン	12mg/m ²	30分	1~3日目	
	急性骨髄性白血病	DNR+Ara-C	ダウノルピシチン	50mg/m ²	30分	1~5日目	
			シタラビン	100mg/m ²	24時間	1~7日目	
	急性骨髄性白血病	High dose Ara-C	シタラビン	2000mg/m ²	3時間	1~5日目	
			シタラビン	2000mg/m ²	3時間	1~5日目	
	急性骨髄性白血病	地固め第1コース MIT+Ara-C	ミトキサントロン	7mg/m ²	30分	1~3日目	
			シタラビン	200mg/m ²	24時間	1~5日目	
	急性骨髄性白血病	地固め第2コース DNR+Ara-C	ダウノルピシチン	50mg/m ²	30分	1~3日目	
シタラビン			200mg/m ²	24時間	1~5日目		
急性骨髄性白血病	地固め第3コース DNR+Ara-C	アクリルピシチン	20mg/m ²	30分	1~5日目		
		シタラビン	200mg/m ²	24時間	1~5日目		
急性骨髄性白血病	地固め第4コース A-triple V	シタラビン	200mg/m ²	24時間	1~5日目		
		エトポシド	100mg/m ²	1時間	1~5日目		
		ピンクリスチン	0.8mg/m ²	ゆっくり	8日目		
			ビンデシン	2mg/m ²	ゆっくり	10日目	