

お名前:

0歳で受けましょう

ワクチンの種類	チェック欄	推奨年齢	接種可能年齢	
B型肝炎	1回目	2ヶ月	生後すぐ～ 1才未満	
	2回目	3ヶ月 (1回目から4週空けて)		
	3回目	7～8ヶ月 (1回目から20～24週)		
ロタ	1回目	6週から	6週～	
	2回目	1回目から4週あけて	ロタリックスは ～24週までに	
	※ロタテック	3回目	2回目から4週あけて ロタテックは ～32週までに	
5種混合 DPT-IPV- Hib	第1期初回	1回目	2～90ヶ月未満	
		2回目		1回目から3～8週間
		3回目		2回目から3～8週間
肺炎球菌	1回目	2ヶ月から	2ヶ月～5歳未満	
	2回目	1回目から4週あけて		
	3回目	2回目から4週あけて		
BCG		5～8ヶ月	1歳未満	

※4種混合とHibを別々に接種した方のみ

Hib (インフルエンザ菌b型)	1回目	2ヶ月から	2ヶ月～5歳未満
	2回目	1回目から3～8週間	
	3回目	2回目から3～8週間	
	追加	3回目の7～13ヶ月後	1歳～5歳未満

※2023/4/1～4種混合の開始月齢が2ヶ月に変更されました  
 ※2024/4/1～5種混合(4種混合+Hib)が使用できるようになりました。

1歳になったら受けましょう

ワクチンの種類	チェック欄	推奨年齢	接種可能年齢
MR	1期	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満
おたふく	1回目	1歳から	1歳～
水ぼうそう	1回目	1歳から	1歳～
	2回目	1回目の半年から1年後	1歳～3歳未満
5種混合 DPT-IPV-Hib	追加	3回目の1年～1年半後	～90ヶ月未満
肺炎球菌	追加	1歳から (3回目から60日以上 あけて)	1歳～ 5歳未満

入学するまでに受けましょう

日本脳炎	1期初回	1回目	3歳～	6～90ヶ月未満
		2回目	1回目から1～4週間	
	1期追加	追加	2回目から1年後	
MR	2期	年長	年長の1年間	
おたふく	2回目	年長 (2回目接種の目安時期)		

小学校で受けましょう

日本脳炎	2期	小学4年生	9～13歳未満
DT	2期	小学6年生	11～13歳未満

中学校で受けましょう(女子のみ)

子宮頸がん <small>※ワクチンの種類、接種開始年齢によって接種間隔が変わります</small>	1回目	小学6年生～	小学6年生～ 高校1年生
	2回目	1回目の1～2ヶ月後	
	3回目	1回目の6ヶ月後	