

## 6 か月～4 才のコロナワクチン接種について

2022 年 10 月 予防接種センター

2022 年 11 月 2 日から 6 か月～4 才のコロナワクチン接種が開始になりました。

当センターでは 11 月 8 日から火曜日の午前に接種を行います。

現時点で分かっている内容は以下です。

### 1) 接種方法

- ・ 1 回 0.2mL を合計 3 回、筋肉内に接種。

1 歳未満 大腿前外側部

1 ～ 2 歳 大腿前外側部または三角筋中央部

3 歳以上 三角筋中央部

2 回目は通常、3 週間の間隔で（原則 20 日、18 日以上）、3 回目は 2 回目の接種から少なくとも 8 週間経過した後に接種。

- ・ インフルエンザワクチンとは同時接種も間隔を空けずに接種可能、それ以外のワクチンは 13 日以上空けて接種。

### 2) 有効性

- ・ オミクロン株（BA. 1）等に対する中和抗体価について、3 回目接種により中和抗体価の上昇
- ・ 3 回目接種 7 日以降における発症予防効果は 73.2%であったと報告されている。

### 3) 安全性

- ・ 成人より軽度であると報告されている。

表 有害事象及びその副反応（主なもの）

|                | 本剤群       |          | プラセボ群     |          |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                | 有害事象 n(%) | 副反応 n(%) | 有害事象 n(%) | 副反応 n(%) |
| <b>2～4 歳</b>   |           |          |           |          |
| 嘔吐             | 50 (2.7)  | 2 (0.1)  | 30 (3.3)  | 2 (0.2)  |
| 下痢             | 26 (1.4)  | 4 (0.2)  | 18 (2.0)  | 4 (0.4)  |
| 発熱             | 55 (3.0)  | 9 (0.5)  | 27 (3.0)  | 3 (0.3)  |
| 注射部位疼痛         | 11 (0.6)  | 10 (0.5) | 5 (0.5)   | 5 (0.5)  |
| <b>6ヶ月～1 歳</b> |           |          |           |          |
| 嘔吐             | 47 (4.0)  | 8 (0.7)  | 29 (4.8)  | 4 (0.7)  |
| 下痢             | 39 (3.3)  | 9 (0.8)  | 17 (2.8)  | 5 (0.8)  |
| 生菌             | 12 (1.0)  | 0        | 8 (1.3)   | 0        |
| 発熱             | 54 (4.6)  | 6 (0.5)  | 28 (4.8)  | 0        |